

## KULLANMA TALİMATI

### ERFULYN 100 mg kapsül

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Nifuroksazid 100 mg
- **Yardımcı maddeler:** Mısır nişastası (kuru), magnezyum stearat, aerosil 200, mikrokristallin sellüloz pH 102, kroskarmelloz sodyum, jelatin (sığır kaynaklı), kapsül boyar maddesi olarak; gün batımı sarısı FCF (E110), titanyum dioksit ve kinolin sarısı içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **ERFULYN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ERFULYN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ERFULYN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ERFULYN'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. ERFULYN nedir ve ne için kullanılır?**

ERFULYN, nifuroksazid etkin maddesini içerir. 1 kapsül içinde 100 mg etkin madde bulunur. 12 kapsül içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca süspansiyon formu da bulunmaktadır.

ERFULYN bölgesel (lokal) etkili bir bağırsak antiseptiğidir. Genel durum bozukluğu, ateş, enfeksiyon veya zehirlenme belirtilerinin görülmediği bakteriyel kökenli olduğu düşünülen akut ishal tedavisinde, su kaybının giderilmesine ek olarak kullanılır

Su kaybının derecesi ve uygulama yolu (ağızdan veya damardan), ishalin şiddetine ve yaşınıza ile durumunuza (eşlik eden hastalıklar vs.) bağlı olarak değişir.

#### **2. ERFULYN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**ERFULYN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Nitrofuran türevlerine veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa
- 6 yaşın altındaki çocuklarda

## **ERFULYN'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- İki gnlk uygulamadan sonra ishal devam ederse,
- Gnde 6 defadan fazla sulu dıřkılamayla seyreden veya 24 saatten uzun sren veya kilo kaybına yol aan ishal durumunda, ya da ateř ve kusma bařlarsa (derhal doktora bařvurunuz),
- Uzun sren řiddetli ishal,
- řiddetli kusma veya yemeđi reddetme durumunda,
- Dıřkıda kan veya mukus bulunursa,

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse, ltfen doktorunuza danıřınız.

## **ERFULYN'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

\* Su kaybının giderilmesi: İshalin neden olduđu sıvı kaybını yerine koymak iin, ocuđunuza bol miktarda řekerli veya řekersiz iecekler iirilmelidir (bir gnde alınması nerilen ortalama su miktarı 2 litredir.)

\* Beslenmenin srdrlmesi: İshal sırasında beslenme srdrlmelidir, ancak;

- iđ sebzeler, meyve, yeřil sebzeler, baharatlı yiyecekler, buzlu iecek veya yiyeceklerin verilmesinden kaınılmalıdır.
- Izgara etler ve pirince ađırlık verilmelidir.
- St ve st rnlerinin kesilip kesilmemesi, her hasta iin ayrıca deđerlendirilmelidir.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamilelik sırasında kullanımıyla ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır, bu nedenle hamilelik sırasında kullanımından mmkn olduđunca kaınılmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Kısa sreli ERFULYN kullanımı sırasında bebek emzirmeyi srdrebilirsiniz.

## **Ara ve makine kullanımı**

ERFULYN'in ara ve makine kullanımı stnde bilinen bir etkisi yoktur.

## **ERFULYN'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

ERFULYN ieriđindeki gn batımı sarısı (sunset sarısı) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

## **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

Alkol bađımlılıđı iin dislfiram gibi bir ila alıyorsanız veya merkezi sinir sistemi baskılayan ilalar alıyorsanız ERFULYN'i bu ilalarla birlikte kullanmayınız.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. ERFULYN nasıl kullanılır?

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Erişkinlerde: Günde 4 defa 2 kapsül (800 mg) alınır.  
Tedavi 7 günden daha uzun sürdürülmemelidir.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Ağızdan alınır.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

6 yaşından büyük çocuklarda: Günde 3-4 defa 2 kapsül (600 mg-800 mg) alınır.

6 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde, yutarken boğaza kaçma riski nedeniyle kapsül formunun kullanımı kontrendikedir. Bu yaş grubuna çocuk (pediyatrik) kullanımına daha uygun olan ağızdan alınan ERFULYN süspansiyon formu önerilir.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Klinik olarak genç hastalarda kullanımından farkı gösteren yeterli çalışma yapılmamıştır. Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedavi şeklini belirleyecektir.

##### **Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:**

Klinik olarak, normal böbrek/karaciğer fonksiyonları olan hastalardan farkı gösteren yeterli çalışma bulunmamaktadır.

Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedavi şeklini belirleyecektir.

*Eğer ERFULYN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

##### **Kullanmanız gerekenden daha fazla ERFULYN kullandıysanız:**

*ERFULYN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

##### **ERFULYN'i kullanmayı unutursanız**

Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

##### **ERFULYN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

ERFULYN tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, hastalığınızla ilgili şikayetleriniz tekrar ortaya çıkabilir.

### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ERFULYN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, ERFULYN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:**

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı

- veya nefes almayı zorlaştıracak kadar şişmesi
- Ani aşırı duyarlılık tepkisi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ERFULYN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın	:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	:Eldeki verilerden sıklığı tahmin edilemiyor.

#### **Bilinmiyor:**

- Döküntü
- Kurdeşen

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. ERFULYN'in Saklanması**

*ERFULYN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ERFULYN'i kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ERFULYN'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

#### ***Ruhsat sahibi:***

NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Ümraniye 34768 İSTANBUL

**Üretim yeri:**

NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.  
Merkez 81100 DÜZCE

*Bu kullanma talimatı 24/11/2023 tarihinde onaylanmıştır.*